

1. Докажите лемму о паросочетаниях: есть несколько (конечное число) юношей и девушек. Каждый юноша любит некоторое (возможно, нулевое) число девушек. Тогда всех юношей можно женить на любимых ими девушках так, чтобы брачные пары не пересекались, тогда и только тогда, когда для любого множества юношей число девушек, которых любит хотя бы один из них, не меньше числа этих юношей.
 - **Теорема Холла.** Пусть S_1, \dots, S_m — конечные множества. В каждом из них можно выбрать по элементу $x_i \in S_i$ так, чтобы все x_i были различны, тогда и только тогда, когда для любого $k \leq m$ объединение любых k из этих множеств имеет не менее k элементов.
2. Какое минимальное количество ребер можно удалить из графа $K_{n,n}$, чтобы не осталось паросочетаний (т. е. подграфа из n непересекающихся отрезков)?
 - Пусть дан набор множеств \mathcal{M} , в каждом из которых выбрали по элементу. Если все элементы различны, то такой набор назовём системой различных представителей (с.р.п.). Формально, с.р.п. для набора \mathcal{M} называется такое инъективное отображение $x: \mathcal{M} \rightarrow \bigcup_{S \in \mathcal{M}} S$, что $x(S) \in S$ для любого $S \in \mathcal{M}$. Это даёт упорядоченный набор, что полезно для подсчёта количества с.р.п.
Например, теорема Холла утверждает, что у системы S_1, \dots, S_m конечных множеств есть с.р.п. тогда и только тогда, когда $|\bigcup_{i \in I} S_i| \geq |I|$ для любого $I \subset \{1, \dots, m\}$.
3. Пусть для системы m -элементных множеств каждый элемент любого из множеств входит ровно в l из них. Докажите, что при $m \geq l$ у этой системы множеств есть с.р.п.
4. Из набора множеств \mathcal{M} выбран поднабор $\mathcal{M}' = \{S_1, \dots, S_k\}$. Пусть x_1, \dots, x_k — с.р.п. \mathcal{M}' . Докажите, что если у всего \mathcal{M} есть с.р.п., то найдётся его с.р.п., содержащая x_1, \dots, x_k .
5. Обозначим через $F(S_1, \dots, S_m)$ количество с.р.п. у набора $\{S_1, \dots, S_m\}$. Для любого ли k существует система S_1, \dots, S_m такая, что $F(S_1, \dots, S_m) = k$?

Домашнее задание

1. Докажите теорему Холла.
2. Найдите все возможные значения $F(S_1, S_2)$ при условии $|S_1| = |S_2| = 5$.
3. Пусть даны два разбиения множества S на m подмножеств:

$$S = \bigsqcup_{i=1}^m A_i = \bigsqcup_{i=1}^m B_i, \quad m \leq |S|.$$

Пусть выполнено следующее условие: для любого подмножества $\{i_1, \dots, i_k\} \subset \{1, \dots, m\}$ множество $A_{i_1} \cup \dots \cup A_{i_k}$ содержит не более k из множеств B_1, \dots, B_m . Докажите, что тогда можно так перенумеровать множества A_1, \dots, A_m , чтобы после перенумерации $A_i \cap B_i \neq \emptyset$ для любого $i = 1, \dots, m$.